


股骨干(大腿骨)骨折(Fracture Shaft of Femur)




股骨干骨折在長管狀骨之骨折中較常見，骨折類形也較多，治療方法很多。此骨折多由嚴重創傷所致，如高處墮下或交通意外等。骨折也因粉碎程度分為簡單和複雜不同類形，開放性骨折表示傷口可直通骨折，受細菌感染機會大增。

處理方法


首先要檢查全身，以防有身體其他部位受傷。如有傷口，便需要清潔，並服用抗生素以防感染。如沒有傷口，則需抬高患肢幫助消腫，有時會用鋼針穿過脛骨(小腿骨)作短暫的牽引。用止痛藥鎮痛，跟著安排照X光，以了解骨折的情形，方便計劃手術。手術一般在二天內進行。

手術簡介


一般會選用接骨鋼板、骨髓內釘或動力螺釘。將骨折復位，用螺釘和接骨鋼板固定；粉碎性骨折，需要額外補骨。手術後一般不用打石膏，二三天內拔除喉管後，便可開始做物理治療，病人需要用拐杖步行，患肢在 6-12 星期內不宜著地。至於接骨鋼板、骨髓內釘或動力螺釘，如病人要求拆除，一般會在手術後一年半才進行。



動力螺釘



接骨鋼板



髓內釘

併發症

(一) 麻醉

- 一般選用全身麻醉，有時用半身麻醉。與麻醉有關的併發症，需要請教麻醉科醫生。

(二) 一般性

- 傷口發炎
- 傷口流血或血腫
- 傷口癒合不良
- 術前舊病惡化，例如高血壓、中風、糖尿病等等

(三) 與此手術有關

- 螺釘、鋼釘、鋼板、髓內釘鬆脫或外露
- 骨折不癒合
- 骨折畸形癒合
- 臀部及膝關節活動不靈活
- 內固定器引致的摩擦和疼痛
- 表皮神經線損傷引至麻痺
- 複雜粉碎性骨折容易引至「長短腳」