


臏骨(波蘿蓋)骨折(Fracture Patella)



橫斷骨折







粉碎性骨折

臏骨位於膝關節前方，具有增強股四頭肌力量和保護膝關節的功能。此類骨折病患者多為壯年及老年人，一般成因由間接或直接暴力造成，前者多為橫斷骨折，斷骨移位較大，後者多為粉碎骨折，斷骨移位較小。股四頭肌的強大拉力使其復位固定均較困難。

處理方法

如骨折輕微移位而患者仍能伸直膝關節者，可使用長腿石膏固定膝關節，大約需時 6 星期，病人可使用手杖或拐杖走路。有移位而屬橫斷性的骨折者，可用手術把骨折固定，一般用鋼絲、鋼釘和螺釘。手術後不用打石膏。如屬粉碎性骨折，有可能要將部份或全部臏骨切除，手術後需要加上石膏。



併發症

(一) 麻醉

- 一般選用全身麻醉，有時用半身麻醉。與麻醉有關的併發症，需要請教麻醉科醫生。

(二) 一般性

- 因石膏引致的問題
- 傷口發炎
- 傷口流血或血腫
- 傷口癒合不良
- 術前舊病惡化，例如高血壓、中風、糖尿病等等

(三) 與此手術有關

- 螺釘、鋼釘、鋼絲鬆脫或外露
- 骨折不癒合
- 骨折畸形癒合
- 膝關節活動不靈活
- 內固定器引致的摩擦和疼痛
- 表皮神經線損傷